

Клинические данные в сравниваемых группах до и после лечения

Показатель	1. с поверхностными ожогами I-II степени на площади до 15% п.т.				2. с ограниченными глубокими ожогами III степени на площади до 5% п.т. при общей площади ожогового поражения до 15% п.т.				3. с площадью поражения более 20% п.т. и ожоговой болезнью			
	Основная группа		Группа сравнения		Основная группа		Группа сравнения		Основная группа		Группа сравнения	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
ЧСС	76,2±0,8	75,3±1,2	79,4±1,5	76,4±1,4	77,3±3	74,1±2,2	81,3±2,6	79±2,0	90,3±2,7	78,6±2,3	90,9±2	77,8±1,7
А/Д	125/74	122/72	125/76	123/75	126/77	126/75	123/80	123/75	127/80	126/77	130/79	126/76
ЧД	17,6±0,3	17±0,3	16,7±0,5	16,4±0,4	18,3±0,4	16,7±0,3	17±0,6	17±0,6	18,5±0,4	17,7±0,2	18,5±0,5	16,9±0,4
Т тела	36,6±0,1	32,9±3,6	36,7±0,05	36,6±0,05	36,9±0,1	36,8±0,2	36,9±0,2	36,7±0,1	37,1±0,2	36,7±0,1	36,9±0,1	3,7±0,1